

# CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA TROMBOLISIS (excepto los relativos a la severidad del déficit)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN		
	SÍ	NO
1. Diagnóstico clínico de ictus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Menos de 4.5 horas de evolución. (3h si mayor de 80 años)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Edad: $\geq$ 18 años	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Rankin previo $\leq$ 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (I)		
	SÍ	NO
1. Déficit detectado al despertar o levantarse de la cama (considerar hora inicio la última vez que fue visto normal).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Crisis epiléptica al comienzo del ictus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Glucemia $<50$ mg/dl ó $>400$ mg/dl. Glucemia: .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. HTA grave no controlada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. TA sistólica $>185$ mmHg o TA diastólica $>105$ mmHg que no desciende tras tratamiento hipotensor no agresivo ( <i>Anexo 4 · Pág. 7</i> ) TA: .....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. En tratamiento con anticoagulación oral o HBPM.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Uso de heparina en las últimas 48h y TTPA prolongado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Diátesis hemorrágica conocida.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hemorragia grave manifiesta o en los últimos 21 días (incluyendo sangrado gastrointestinal o urinario)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Sospecha o historia conocida de hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea o después de hemorragia por aneurisma.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Cualquier historia de lesión del sistema nervioso central (neoplasia, aneurisma, cirugía intracraneal o espinal).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ictus (excepto AIT) o TCE grave en los últimos 3 meses. Ictus isquémico previo y diabetes mellitus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (II)

	SÍ	NO
13.Aneurismas arteriales, malformaciones arteriales/venosas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.Punción de vaso sanguíneo no compresible (yugular o subclavia) en los últimos 10 días.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.Punción lumbar en los últimos 7 días.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.Neoplasia con riesgo de hemorragia aumentado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.Retinopatía hemorrágica (puede indicarla, por ejemplo, alteración visual en diabéticos).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.Cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos tres meses.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.Masaje cardíaco externo traumático en los últimos 10 días.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.Infarto de miocardio en las últimas 4 semanas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.Endocarditis bacteriana. Pericarditis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.Pancreatitis aguda.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.Biopsia hepática o pulmonar en los últimos 14 días.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.Enfermedad hepática grave: Insuficiencia hepática. Cirrosis. Hipertensión portal. Varices esofágicas. Hepatitis activa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada durante los últimos tres meses.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.Embarazo. Parto obstétrico en el último mes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. <b>TC craneal</b> con hemorragia o signos indirectos de infarto extenso. Sospecha de hemorragia subaracnoidea aunque TC normal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. <b>Plaquetas:</b> < 100.000 /ml.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>